

# SIF5005 – Matematikk 2 – 2003

## Mapleøving 2

Det er mer stoff her enn dere kan forventes å komme gjennom på et par timer. Prøv å bruke litt tid på hver oppgave, og ta én av dem lengre og dypere. Prøv det gjerne ut på andre eksempler som interesserer deg.

**Oppgave 1.** Bruk Maple til å tegne funksjonen fra oppgave 8 i hjemmeøving 2:

$$f(x, y) = e^{-x^2}(y^2 + 1).$$

**NB!** Du må bruke `exp` for eksponensialfunksjonen i Maple!

Tegn grafen til  $f(x, y) = x^3 - xy^2 + y^3$  i en passe omegn om origo. Regn ut de partiellderiverte  $D_1f$  og  $D_2f$  og tegn dem i samme graf som  $f$  selv. (Litt avhengig av hvilket område du har valgt, kan du bli nødt til å gange noen av funksjonene med en konstant for å få dem alle omtrent like store.) Klarer du å se hvilken som er hvilken av disse grafene?

Tegn heller konturplott og gradientplott for samme funksjon  $f$ . Se `plots[contourplot]` og `plots[gradplot]`. Forsøk deg frem med opsjonen `filled=true` i konturplott. Kombiner de to plottene i én tegning. Gradienten gir en mye mer umiddelbar geometrisk forståelse enn de to partiellderiverte hver for seg!

**Oppgave 2.** Gjør (deler av) oppgave 6 fra hjemmeøving 3 med Maple:

$$f(x, y) = -x^3 + x^2 + 3x - x^2y + \frac{1}{2}y^2.$$

Finn kritiske punkter med tilhørende verdier, tegn konturplott, klassifiser de kritiske punktene.

Maplefunksjonen `extrema` kan være nyttig.

`extrema(f(x,y), {}, {x,y}, 'p')`; returnerer største og minste funksjonsverdi blant de kritiske punktene for  $f$ . Variabelen `p` vil inneholde  $x$ - og  $y$ -verdier for de kritiske punktene. (Det andre argumentet, `{}` her, er for bibetingelser. Legger du til noen ligninger her, vil Maple utføre Lagranges metode.)

**Oppgave 3.** (Denne oppgaven ble gitt til eksamen i mai 1991.) Finn de og klassifiser de kritiske punktene til

$$f(x, y) = 3xe^y - x^3 - e^{3y}.$$

(Det er bare ett. Maple finner to, men det andre har komplekse koordinater, så det er det bare å kaste.) Har  $f$  noe globalt maksimum? Virker resultatet rart? I strid med intuisjonen? Kanskje det er på tide å skaffe seg en bedre intuisjon! Tegn konturplott og/eller grafen til  $f$  og prøv å forstå hva som skjer.

En annen funksjon som gir et tilsvarende paradoksal resultat er

$$f(x, y) = -(x^2 - 1)^2 - (x^2y - x - 1)^2.$$

Undersøk funksjonen.

**Oppgave 4.** Tegn figur av flaten fra oppgave 6 i hjemmeøving 2. Den var gitt i kulekoordinater ved  $\rho = 1 - \cos \varphi$ .

Maple regner kulekoordinater som talltripler  $(\rho, \theta, \varphi)$ . Du kan plote med dem på parameterform eller som en skalar – og i det siste tilfellet regner den  $\rho$  som en funksjon av  $\theta$  og  $\varphi$  – ved `plot3d(...,coords=spherical);`.

Tegn figur av flatene i oppgave 4 i hjemmeøving 2.  $S_1: x = y^2 + z^2$  og  $S_2: y = x^2 + z^2$ . Maple regner sylinderkoordinater som talltripler  $(r, \theta, z)$ . Du kan plote med dem på parameterform eller som en skalar – og i det siste tilfellet regner den  $r$  som en funksjon av  $\theta$  og  $z$  – ved `plot3d(...,coords=cylindrical);`.

Flaten  $z = x^2 + y^2$  kan skrives i sylinderkoordinater som  $z = r^2$ , som egner seg til parametrisk plotting med  $(r, \theta, z) = (r, \theta, r^2)$  der du altså bruker  $r$  og  $\theta$  som parametre.

Hvis du lagrer den tegningen i en variabel, kan du enkelt få flatene  $S_1$  og  $S_2$  ved hjelp av `plottools[transform]`.

`plottools[transform]((x,y,z)->[x,z,y])(figur)` vil for eksempel produsere tegningen `figur` med  $y$ - og  $z$ -koordinatene byttet om.

Dette er forresten et eksempel på noe man i matematikken kaller en *høyere ordens funksjon*: Når funksjonen  $T$  anvendt på en verdi  $w$  selv blir en funksjon  $T(w)$ , som så kan anvendes på en verdi  $p$  og gi et resultat som vi skriver  $T(w)(p)$ . I eksemplet blir det kanskje ikke mindre abstrakt fordi  $w$  også er en funksjon (nemlig  $(x, y, z) \rightarrow (x, z, y)$ ).

`plottools[transform]` kan også brukes til ikkelineære transformasjoner av grafer, men det fører kanskje litt langt å se på det her.